

Protege a las personas con diabetes con las vacunas recomendadas

VACUNA	RECOMENDACIONES POR EDAD	CRONOGRAMA
COVID-19	Recomendada para todos a partir de los 6 meses de edad.	Vacunación inicial vigente y dosis de refuerzo
Hepatitis B	Personas menores de 60 años de edad Personas a partir de 60 años de edad, según la evaluación de riesgo del profesional de salud	
Influenza	Recomendada para todos a partir de los 6 meses de edad. En las personas ≥ 65 años, puede haber un beneficio adicional de una de las vacunas antigripales inactivadas de dosis alta o recombinantes o inactivadas adyuvadas. No se debe utilizar la vacuna viva atenuada (en aerosol nasal)	Anual
Neumonía (vacuna anterior PPSV23)	19-64 años de edad	<ul style="list-style-type: none"> • Si recibiste la PCV13, administra una dosis de la PPSV23 • Si recibiste PCV15, continúa con PPSV23 después de ≥ 1 año • La PPSV23 no está indicada después de la PCV20 • Los adultos que recibieron solo la PPSV23 pueden recibir la PCV15 o la PCV20 \geq año después de su última dosis
	a partir de los 65 años de edad	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda una dosis para quienes recibieron previamente la PCV13 • Si se utilizó la PCV15, continuar con la PPSV23 \geq año después • La PPSV23 no está indicada después de la PCV20
Neumonía (vacunas más recientes: PCV15 o PCV 20)	Adultos inmunocomprometidos de 19 a 64 años de edad (por ejemplo, insuficiencia renal crónica), implante coclear o fuga de líquido cefalorraquídeo	Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan una dosis de PCV15 o PCV20.
	Personas inmunocomprometidas de 19 a 64 años de edad.	Para aquellos que nunca han recibido ninguna vacuna neumocócica, los CDC recomiendan una dosis de PCV15 o PCV20
	Las personas inmunocomprometidas a partir de los 65 años de edad, deben compartir su opinión con profesionales de la salud en la toma de decisiones.	<ul style="list-style-type: none"> • Una dosis de PCV15 o PCV20 • La PCSV23 puede ser administrada ≥ 8 semanas después de la PCV15 • La PPSV23 no está indicada después de la PCV20
VSR	Los adultos mayores de 60 años de edad con diabetes parecen ser un grupo de riesgo	Puedes recibir una dosis única de la vacuna contra el
Tétano, difteria y tos ferina (Tdap)	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los adultos • Las personas embarazadas deben recibir una dosis adicional 	Refuerzo cada 10 años
Herpes zóster	A partir de 50 años de edad	Dos dosis, incluso si fueron vacunados previamente



Esta infografía se basa en las recomendaciones de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) Estándares de Atención en Diabetes-2024