

# Protege a las personas con diabetes con las vacunas recomendadas

EIDADES RECOMENDADAS PARA LA VACUNA		CRONOGRAMA
COVID-19	Recomendada para todos a partir de los 6 meses de edad	Vacunación inicial vigente y dosis de refuerzo
Hepatitis B	Personas menores de 60 años de edad Personas a partir de 60 años de edad, según la evaluación de riesgo del profesional de salud	
Influenza	Todos los individuos $\geq 6$ meses de edad que no tengan contraindicación. Se recomienda que a todas las personas con diabetes se les apliquen las vacunas antigripales inactivas o recombinantes. Se advierte a todas las personas con diabetes que no tomen la vacuna viva atenuada (aerosol nasal).	Anual
Neumonía (Vacuna antigua PPSV23)	De 19 a 64 años de edad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si recibiste la PCV13, administra una dosis de la PPSV23</li> <li>• Si recibiste PCV15, continúa con PPSV23 después de 21 años</li> <li>• La PPSV23 no está indicada después de la PCV20</li> <li>• Los adultos que recibieron solo la PPSV23 pueden recibir la PCV15 o la PCV20 <math>\geq 1</math> año después de su última dosis</li> </ul>
	a partir de los 65 años de edad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda una dosis para quienes recibieron previamente la PCV13</li> <li>• Si se utilizó la PCV15, continuar con la PPSV23 <math>\geq 1</math> año después</li> <li>• La PPSV23 no está indicada después de la PCV20</li> </ul>
Neumonía (Vacunas más recientes: PCV15 o PCV 20)	Adultos inmunocomprometidos de 19 a 64 años de edad (por ejemplo, insuficiencia renal crónica), implante coclear o fuga de líquido cefalorraquídeo	Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan una dosis de PCV15 o PCV20.
	Personas inmunocomprometidas de 19 a 64 años de edad.	Para aquellos que nunca han recibido ninguna vacuna neumocócica, los CDC recomiendan una dosis de PCV15 o PCV20
	Las personas inmunocomprometidas a partir de los 65 años de edad deben compartir su opinión con profesionales de la salud en la toma de decisiones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una dosis de PCV15 o PCV20</li> <li>• La PCSV23 puede ser administrada <math>\geq 8</math> semanas después de la PCV15</li> <li>• La PPSV23 no está indicada después de la PCV20</li> </ul>
VSR	Los adultos mayores de 60 años de edad con diabetes parecen ser un grupo de riesgo	Puedes recibir una dosis única de la vacuna contra el VSR
Tétano, difteria y tos ferina (Tdap)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos los adultos</li> <li>• Las personas embarazadas deben recibir una dosis adicional</li> </ul>	Refuerzo cada 10 años
Herpes zóster	A partir de 50 años de edad	Dos dosis, incluso si fueron vacunados previamente

